



Dokumentation PUCAI-Index:

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| In den letzten 24 Stunden | Datum | | | | | | | | |
| Bauchschmerzen | Punkte | | | | | | | | |
| keine | 0 | | | | | | | | |
| Schmerz ignorierbar | 5 | | | | | | | | |
| Schmerz nicht ignorierbar | 10 | | | | | | | | |
| Perianale Blutung | Punkte | | | | | | | | |
| Keine | 0 | | | | | | | | |
| Wenig, selten (<50% der Stühle) | 10 | | | | | | | | |
| Wenig, oft (>50% der Stühle) | 20 | | | | | | | | |
| Viel (>50% des Stuhlvolumens) | 30 | | | | | | | | |
| Stuhlkonsistenz der meisten Stühle | Punkte | | | | | | | | |
| Geformt | 0 | | | | | | | | |
| teilweise geformt | 5 | | | | | | | | |
| komplett ungeformt | 10 | | | | | | | | |
| Anzahl der Stühle in 24 Stunden | Punkte | | | | | | | | |
| 0 – 2 | 0 | | | | | | | | |
| 3 – 5 | 5 | | | | | | | | |
| 6 – 8 | 10 | | | | | | | | |
| > 8 | 15 | | | | | | | | |
| Stuhlgang nachts (der zu Erwachen führt) | Punkte | | | | | | | | |
| Nein | 0 | | | | | | | | |
| Ja | 10 | | | | | | | | |
| Einschränkung von Leistung / Alltagsaktivität | Punkte | | | | | | | | |
| Keine Einschränkung | 0 | | | | | | | | |
| Geringe / teilweise | 5 | | | | | | | | |
| Einschränkung | 10 | | | | | | | | |
| Schwere Einschränkung | | | | | | | | | |
| Summe des PUCAI | (0–85) | | | | | | | | |

Interpretation Colitis Aktivität: <10 keine; 10-30 mild; 35-60 moderat; >60 schwer



Dokumentation PUCAI-Index:

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| In den letzten 24 Stunden | Datum | | | | | | | | |
| Bauchschmerzen | Punkte | | | | | | | | |
| keine | 0 | | | | | | | | |
| Schmerz ignorierbar | 5 | | | | | | | | |
| Schmerz nicht ignorierbar | 10 | | | | | | | | |
| Perianale Blutung | Punkte | | | | | | | | |
| Keine | 0 | | | | | | | | |
| Wenig, selten (<50% der Stühle) | 10 | | | | | | | | |
| Wenig, oft (>50% der Stühle) | 20 | | | | | | | | |
| Viel (>50% des Stuhlvolumens) | 30 | | | | | | | | |
| Stuhlkonsistenz der meisten Stühle | Punkte | | | | | | | | |
| Geformt | 0 | | | | | | | | |
| teilweise geformt | 5 | | | | | | | | |
| komplett ungeformt | 10 | | | | | | | | |
| Anzahl der Stühle in 24 Stunden | Punkte | | | | | | | | |
| 0 – 2 | 0 | | | | | | | | |
| 3 – 5 | 5 | | | | | | | | |
| 6 – 8 | 10 | | | | | | | | |
| > 8 | 15 | | | | | | | | |
| Stuhlgang nachts (der zu Erwachen führt) | Punkte | | | | | | | | |
| Nein | 0 | | | | | | | | |
| Ja | 10 | | | | | | | | |
| Einschränkung von Leistung / Alltagsaktivität | Punkte | | | | | | | | |
| Keine Einschränkung | 0 | | | | | | | | |
| Geringe / teilweise | 5 | | | | | | | | |
| Einschränkung | 10 | | | | | | | | |
| Schwere Einschränkung | | | | | | | | | |
| Summe des PUCAI | (0–85) | | | | | | | | |

Interpretation Colitis Aktivität: <10 keine; 10-30 mild; 35-60 moderat; >60 schwer